



雙腔動靜脈導管照護注意事項

2017.07 制定

一、雙腔動靜脈導管：

半永久性的雙腔導 (Perm-cath) 是部分長期的血液透析須依賴的血管通路。此導管置入技術容易、立即可用、操作簡單、不須扎針。如何預防感染及保持導管暢通可利用，是您日常須留意的照顧重點。

二、適應症：

(一)動靜脈瘻管屢次失敗者。

(二)周邊血管硬化，沒有適當的位置可作動靜脈瘻管者。

(三)反覆接受血漿置換術的病人。

(四)末期尿毒症病人。

(五)病人自我的選擇。

三、導管的自我照顧

(一) 保持導管周圍傷口的清潔燥，避免用手抓癢。

(二) 若有流汗、盜汗，請儘快擦乾，避免汗水弄髒傷口。

- (三) 每日注意清潔衛生，可洗澡但請採擦澡，避免用濕傷口，若用濕傷口時，請立即消毒換藥。
- (四) 紗布或紙膠勿自行撕開，任意敞開傷口及用手碰觸患部。
- (五) 萬一不慎導管滑脫，請立即使用乾淨紗布加壓止血，並立即至急診尋求醫護人員協助。
- (六) 每日觀察導管在外的長度，如自覺導管移位、縫線脫落，請至醫院就診。
- (七) 若發現傷口異常疼痛，明顯的紅腫熱痛、瘀血、滲血、發燒請一定要告知醫護人員。

天主教輔仁大學附設醫院護理部
祝您 平安、健康、喜樂

